BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Bananes

Martinique

N° 3 – Mars 2020

METEOROLOGIE

Très déficitaire en pluie !

Alors que le début du carême 2020 avait une pluviosité relativement normale, voire un peu humide, le mois de mars voit s'installer un temps de plus en plus sec et très ensoleillé. Le sud atlantique et la façade caraïbe sont les plus concernés.
Belle exposition du soleil, rarement aussi durable avec 244 heures au total. Les alizés soufflent moins fort que d'ordinaire : 15,5km/h en moyenne au Lamentin.

Source : Météo France Antilles-Guyane

A RETENIR

Augmentation de l'infestation en Martinique.

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).
Animateur filière : Jouby ALEXANDRE (PRESTA'SCIC).
Comité de relecture : Thierry VILNA (CA), Olivier CAREME (CA).
Crédit photo : Chambre d'Agriculture de la Martinique.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

CHARANÇON DU BANANIER : NIVEAUX D'INFESTATION

Mars 2020

LE CLASSEMENT DES COMMUNES

	COMMUNES	MARS. 2020	FEV. 2020	JAN. 2019	
1er	Le Vauclin	89	85	475	↓
2ème	Macouba	115	ND	202	
3ème	Le François	122	231	152	↓
4ème	Saint-Pierre	146	ND	ND	
5ème	Le Robert	181	ND	ND	
6ème	Basse-Pointe	232	155	ND	↑
7ème	Saint-Esprit	238	138	ND	↑
8ème	Le Lamentin	260	111	57	↑
9ème	Sainte Marie	420	247	ND	↑
10ème	Le Lorrain	472	ND	ND	

Données en nombre de captures par hectare
ND : pas de données.



COMMENTAIRES

La tendance globale de l'évolution de l'infestation sur le territoire martiniquais est à la **hausse sur le mois de mars**. La densité moyenne (moyenne de captures par hectare) est passée de **188** à **228**. La hausse de captures est située sur les communes de Basse-Pointe, du Saint-Esprit, du Lamentin et de Sainte-Marie. Sur les communes du Vauclin et du François, le nombre de captures a diminué.

PRESTA' SCIC

Jachère raisonnée

Après plusieurs années de culture de banane, le rendement d'une parcelle diminue, pour différentes raisons :

- ✓ la perte de densité due à la chute de certains plants (coups de vent, parasitisme)
- ✓ la dégradation de la structure du peuplement (distance entre bananiers, bananiers
- ✓ sous étagés improductifs)
- ✓ la diminution de la fertilité des sols (compaction et érosion).

Ceci impose le renouvellement de la plantation et la mise en jachère.

La jachère permet d'éliminer les parasites inféodés au bananier en supprimant la culture, de régénérer la fertilité des sols en restaurant leur structure grâce à l'action du travail du sol et/ou de plantes de couverture, et de corriger les déficiences du sol par des apports d'amendements.

Jachère de *Brachiaria Decumbens*
Source : IT2