BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Bananes

Martinique

N° 4 – Avril 2020

METEOROLOGIE

A RETENIR

Diminution de l'infestation en Martinique.

Toujours très déficitaire en pluie !

La pluviométrie est déficitaire depuis le mois de mars. La sécheresse s'accentue encore sur la période. Concernant les températures elles restent très élevées notamment les températures nocturnes. Les alizées par contre soufflent conformément à la saison.

Source : Météo France Antilles-Guyane

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).
Animateur filière : Jouby ALEXANDRE (PRESTA'SCIC).
Comité de relecture : Thierry VILNA (CA), Olivier CAREME (CA).
Crédit photo : Chambre d'Agriculture de la Martinique.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

CHARANÇON DU BANANIER : NIVEAUX D'INFESTATION

Avril 2020

LE CLASSEMENT DES COMMUNES

	COMMUNES	AVR. 2020	MARS. 2020	FEV. 2020	
1er	Le Lorrain	79	472	ND	↓
2ème	Le Lamentin	114	260	111	↓
3ème	Le Vauclin	137	89	85	↑
4ème	Sainte Marie	141	420	247	↓
5ème	Macouba	214	115	ND	↑

Données en nombre de captures par hectare
ND : pas de données.



COMMENTAIRES

La tendance globale de l'évolution de l'infestation sur le territoire martiniquais est à la **baisse sur le mois d'avril**. La densité moyenne (moyenne de captures par hectare) est passée de **228** à **137**. La hausse de captures est située sur les communes du Vauclin et de Macouba. Sur les communes du Lorrain, du Lamentin et de Sainte-Marie, le nombre de captures a diminué.

PRESTA' SCIC

Petit mouron

Le petit mouron *drymaria cordata* est une plante locale largement répandue en Martinique. On la retrouve spontanément sous certaines bananeraies établies (Nord Atlantique en Martinique), plus rarement en jachère (Centre Martinique).
C'est une herbe à tiges grêles, fragiles, rampantes de 30 cm de long et très ramifiées. Le fruit est une capsule qui s'ouvre en 3 valves. Il contient 5 à 7 graines de couleur noire. La plante se reproduit par multiplication végétative (stolons) ou par graines toute l'année.
Ces qualités :

- ✓ Très bonne couverture des sols ;
- ✓ Tolérance à l'ombrage ;
- ✓ Contrôle des adventices ;
- ✓ Non hôte des principaux nématodes phytoparasites du bananier.

Petit mouron
Source : CA

Source : IT2