BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Bananes

Martinique

N° 10 – Octobre 2020

METEOROLOGIE

La pluviométrie est largement excédentaire !

La **pluviométrie** est de +20% sur la façade caraïbe et +58% au Lamentin. Tandis que les **températures** ont diminuées sur la période notamment les températures nocturnes (23,8° C en moyenne au Lamentin). De même, l'**ensoleillement** est faible sur la période avec à peine 161 heures de présence et les **alizés** soufflent un peu moins que d'habitude : 12,6km/h en moyenne à l'aéroport.

Source : Météo France Antilles-Guyane.

A RETENIR

Augmentation de l'infestation en Martinique.

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).
Animatrice filière : Jouby ALEXANDRE (PRESTA'SCIC).
Comité de relecture : Thierry VILNA(CA), Mylène ETIENNE (CA), Olivier CAREME (CA).
Crédit photo : Chambre d'Agriculture de la Martinique.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

CHARANÇON DU BANANIER : NIVEAUX D'INFESTATION

Octobre 2020

LE CLASSEMENT DES COMMUNES

	COMMUNES	OCT. 2020	SEPT 2020	AOÛT. 2020	
1er	Saint-Esprit	66	188	Nd	↓
2ème	Saint-Pierre	76	112	ND	↓
3ème	Le Lamentin	109	69	119	↑
4ème	Le François	125	106	125	↑
5ème	Sainte-Marie	125	335	126	↓
6ème	Le Morne Rouge	128	ND	128	
7ème	Macouba	167	153	ND	↑
8ème	Le Vauclin	185	88	120	↑
9ème	Le Lorrain	232	32	542	↑
10ème	Le Robert	302	153	ND	↑

Données en nombre de captures par hectare
ND : pas de données.



COMMENTAIRES

La tendance globale de l'évolution de l'infestation sur le territoire martiniquais est à la **hausse sur le mois d'octobre**. La densité moyenne (moyenne de captures par hectare) est passée de **140** à **151**. La hausse de captures est située sur les communes du Lamentin, du François, de Macouba, du Vauclin, du Lorrain et du Robert. Le nombre de captures a diminué sur les communes du Saint-Esprit, de Saint-Pierre et de Sainte-Marie.

PRESTA' SCIC

Qu'est-ce qu'un piège à phéromones ?

Les charançons mâles produisent des phéromones d'agrégation (signal de regroupement), attirant les autres mâles et les femelles. La sordinine est un mélange de synthèse de 4 isomères reproduisant artificiellement ce phénomène. Ces pièges sont constitués d'un diffuseur de phéromone et de synergisant (substance améliorant l'efficacité de la phéromone) placés dans une boîte : les charançons adultes qui se déplacent sont attirés par la phéromone et se noient (piège à eau savonneuse) ou restent emprisonnés (pièges secs à collerette). Un piège à phéromone capture les charançons présents dans un rayon d'environ 15 mètres.